

FICHA TÉCNICA

AUROCEF®

Polvo Estéril para Reconstituir
(Uso Veterinario)

ANTIBIÓTICO DE AMPLIO ESPECTRO

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de polvo una vez reconstituido contiene:

Ceftiofur sódico.....50 mg
(Como Ceftiofur base: 47.9mg)
Excipientes c.s.p..... 1 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Bovinos, Equinos, Perros y Porcinos

INDICACIONES:

En **Bovinos** para el tratamiento de infecciones respiratorias ocasionadas por: *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, e *Histophilus somni* y de Necrobacilosis interdigital aguda asociada a *Fusobacterium necrophorum*, y *Bacteroides melaninogenicus*.

En **Porcinos** para el tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella cholerae suis* y *Streptococcus suis* tipo 2.

En **Equinos** para el tratamiento de infección respiratoria asociada a *Streptococcus zooepidemicus*.

En **Caninos** para el tratamiento de infecciones del tracto urinario asociadas con *Escherichia coli* y *Proteus mirabilis*.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACION:

Vía intramuscular: Bovinos, Equinos y Porcinos.

Vía Subcutánea: Perros.



Bovinos: 1 mg/kg - 2 mg/kg de peso vivo. En la práctica 1 mL a 2 mL por cada 50 kg de peso. El tratamiento debe repetirse cada 24 horas durante 3 días consecutivos, máximo 5 días.

Equinos: 2 mg/kg - 4 mg/kg de peso vivo. En la práctica 2 mL a 4 mL por cada 50 kg de peso. Administrar solo 10 mL por sitio de inyección. El tratamiento se da a intervalos de 24 horas y se continúa por 48 horas una vez que los signos clínicos desaparezcan.

Porcinos: 3 mg/kg - 5mg/kg de peso vivo. En la práctica 0.6 mL a 1mL por cada 10 kg de peso. El tratamiento debe repetirse cada 24 horas por un total de 3 días consecutivos.

Perros: 2.2 mg por kg de peso de peso vivo. En la práctica 0.4 mL por cada 10 kg de peso. El tratamiento debe repetirse cada 24 horas durante 5 a 14 días, sino se observa mejoría en 3 a 5 días, reconsiderar el diagnóstico.

MODO DE USO

Presentación de 1 g para reconstituir:

Preparar en el momento de uso, mezclando en el frasco de 1 g de polvo estéril con 20 mL de diluyente estéril, agitando hasta que la suspensión quede homogénea Usar aguja larga y estéril.

Presentación de 4 g para reconstituir:

Preparar en el momento de uso, mezclando en el frasco de 4 g de polvo estéril con 80 mL de diluyente estéril, agitando hasta que la suspensión quede homogénea Usar aguja larga y estéril.

TIEMPO DE RETIRO

Los Bovinos y Porcinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano durante el tratamiento y hasta 4 días después de finalizado el mismo. No requiere tiempo de retiro en leche.



PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.

No usar en Equinos destinados al consumo humano.

El uso de dosis más altas que las aprobadas o la administración por vías diferentes, puede generar residuos perjudiciales en tejidos comestibles y/o en leche.

No administrar en animales con sensibilidad conocida al Ceftiofur.

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco x 1g con diluyente de 20 mL

Frasco x 4 g con diluyente de 80 mL

Reg. ICA: 7849 MV

AUROFARMA®

Plan Colectivo 
de Gestión de Devolución Posconsumo
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurofarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprove

