

FICHA TÉCNICA

AUROTILMICOSIN

Solución oral

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada 100 mL de Solución oral contiene:

Tilmicosina base.....	25 g
(Como Tilmicosina fosfato 27.8 g)	
Excipientes c.s.p.....	100 mL

INDICACIONES

En pollos de engorde para el tratamiento y control de infecciones respiratorias causadas por: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Pasteurella multocida* y *Ornithobacterium rhinotracheale*. En Porcinos para el tratamiento y control de las infecciones respiratorias causadas por: *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Trueperella pyogenes*.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Pollos de engorde: Administrar Vía Oral en el agua de bebida a razón de 15 - 20 mg de AUROTILMICOSIN® por kg de peso vivo. En la práctica diluir 0.3 mL por cada litro de agua de bebida, durante 3 días consecutivos.

Cerdos: Administrar Vía Oral en el agua de bebida a razón de 15 - 20 mg de AUROTILMICOSIN® por kg de peso vivo. En la práctica diluir 0.8 mL por cada litro de agua de bebida, durante 5 días consecutivos.



Los animales muy enfermos tienden a beber menos agua pudiendo necesitar un tratamiento específico, preferiblemente con una medicación parenteral. El uso inapropiado del medicamento puede aumentar la prevalencia de bacterias resistentes a la Tilmicosina y podría disminuir la efectividad del tratamiento con sustancias relacionadas con la Tilmicosina.

TIEMPO DE RETIRO

Los porcinos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.

Los pollos de engorde tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 7 días después de finalizado el tratamiento. No administrar a aves en producción de huevo destinado al consumo humano.

PRECAUCIONES

El uso del medicamento debe basarse en pruebas de susceptibilidad.

Preparar las soluciones medicadas diariamente.

No permitir el acceso al agua medicada a los Equinos. Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos. Para su manipulación use ropa protectora y guantes.

Lavarse las manos después de manipular el producto. No comer, beber ni fumar mientras se manipule el medicamento.

En caso de ingestión accidental, lavarse inmediatamente la boca con agua y acudir al Médico. En caso de contacto accidental con la piel, lavarse bien con agua y jabón.

En caso de contacto accidental con los ojos, lavarse los ojos con abundante agua.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario. Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

CONTRAINDICACIONES

No suministrar a animales con hipersensibilidad o resistencia a la Tilmicosina. No suministrar concomitante con otros Macrólidos, Lincosamidas o Ionóforos.



AUROFARMA[®]

BIENESTAR Y SALUD ANIMAL

Reg ICA 10424-MV

PRESENTACIONES: Frascos x 240, 500 y 1000mL

www.AUROFARMA.com

