

FICHA TÉCNICA
CABATEL® NF
Suspensión oral
Uso Veterinario

ANTIPARASITARIO**COMPOSICIÓN:**

Cada 100 mL de suspensión oral contienen:

Ivermectina	1,0 g
Fenbendazol	22,5 g
Praziquantel	7,5 g
Excipientes c.s.p.	100 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:

Equinos.

INDICACIONES:

Endectocida de amplio espectro indicado en Equinos para el tratamiento y control de parásitos gastrointestinales, pulmonares y cutáneos tales como: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus edentatus*, *Strongylus equinus*: (fases infectantes larvarias y adultos). *Triodontophorus spp.* *Oxyuris equi*, *Trichostrongylus axei*, *Strongyloides westeri*, *Parafilaria multipapillosa*. *Onchocerca spp.*, *Draschia megastoma*, *Habronema spp.*, *Anoplocephala magna*, *Anoplocephala perfoliata*, *Paranoplocephala mamillana*. *Echinococcus granulosus*, *Dictyocaulus arnfieldi* y *Gasterophilus spp.*

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

DOSIFICACIÓN:

Administrar vía oral 200 mcg de Ivermectina por kg; 1,5 mg de Praziquantel por kg; 5 mg de Fenbendazol por kg. En la práctica suministrar 1 mL por cada 50 kg de peso. La jeringa de 10 mL permite tratar un caballo de 500 kg de peso



PRECAUCIONES:

Venta bajo fórmula del Médico veterinario.

No administrar a Equinos con daño hepático y/o renal preexistente

No suministrar a caballos destinados al consumo humano

No utilizar para el tratamiento de *Parascaris equorum* cuando se sospeche la infestación.

Únicamente debe emplearse cuando se observen infestaciones mixtas.

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.

Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.

PRESENTACIONES:

Jeringa x 10 mL

COLOMBIA Reg. ICA 10488 MV

