

FICHA TÉCNICA

CIPERMETRINA 15 EC AUROFARMA®

CONCENTRADO EMULSIONABLE

USO VETERINARIO

GARRAPATICIDA – MOSQUICIDA DE USO EXTERNO

COMPOSICIÓN:

Cada 1000 mL de concentrado emulsionable contienen:

Cipermetrina..... 150 g

Excipientes c.s.p.....1000 mL

Colombia Registro ICA 6671 MV

Titular del Registro: LABORATORIOS AUROFARMA S.A.S

Km 13 vía occidente Funza, Bodegas Itacol.

Funza, Cundinamarca – Colombia

PBX: (571) 422 1390 – 422 1391

www.aurofarma.com



Categoría Toxicológica II
ALTAMENTE TÓXICO



CUIDADO
VENENO



**LEER LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES
DOMÉSTICOS.**

ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

CIPERMETRINA 15 EC AUROFARMA® Durante la preparación y aplicación usar Guantes de neopreno, ropa protectora, botas de caucho, mascarilla y gafas. No respirar la neblina y vapores de la aspersión. Evitar el contacto con la piel, los ojos, o ropa. No comer, beber, ni fumar durante el manejo y aplicación del producto. En instalaciones ganaderas evitar contaminar comida para consumo directo. Terminada la tarea, lavarse abundantemente con agua las partes del cuerpo expuestas. Quitarse la ropa de trabajo y lavarla separada de otras prendas antes de volver a usar. Lave los elementos empleados en la preparación y aplicación del producto.



PRIMEROS AUXILIOS: Consultar al médico en todos los casos de exposición.

OJOS: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos. **PIEL:** Sacar la ropa y lavar con abundante agua y jabón. **INHALACIÓN:** Llevar al paciente al aire fresco suministrar oxígeno si hay dificultad al respirar. **INGESTIÓN:** No provocar el vómito. Administrar carbón activado con abundante agua si la persona está consciente. **SINTOMAS DE INTOXICACION:** Dolor de cabeza, mareos, fatiga y anorexia, en casos severos, convulsiones.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No hay antídoto específico. Tratar sintomáticamente y bajo supervisión del médico. Si hay convulsiones administrar Diazepam 10 mg para adultos, tratar asma o anafilaxia con Adrenalina 0,1 a 0,5 mL vía I.M.

EN CASO DE INTOXICACION, NO PROVOQUE EL VOMITO, LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA

EN CASO DE INTOXICACIÓN DEL ANIMAL, LLAMAR AL MÉDICO VETERINARIO.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Producto Altamente Tóxico para los **Peces**. No contamine las fuentes de agua ni con el rocío de la aspersión, ni con los desechos de la aplicación, con envases vacíos o agua de lavado de los equipos de aspersión. **Abejas:** Altamente Tóxico. Aplicar lejos de enjambres de abejas. **Aves:** Prácticamente No TÓXICO. No aplicar en lugares cercanos o sobre los dormideros.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO.

Almacénese en un sitio seguro, bien cerrado en su envase original. No almacenar con Alimentos de uso Humano o Animal.

Consérvese a una temperatura inferior de 30°C.

Ningún envase que haya contenido Plaguicidas deberá utilizarse para conservar alimentos o agua potable.

DISPOSICION DE DESECHOS Y DE ENVASES VACÍOS.

Después de usar el contenido, enjuague 3 veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación, luego inutilice perforándolo y deposítelo de manera segura en el lugar destinado por las autoridades locales. En caso de derrames, recogerlos con tierra, arena o aserrín y disponer de los residuos de acuerdo a la normatividad local vigente.



INDICACIONES: Está indicado en Bovinos para el tratamiento y control de **Garrapatas:** *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma cajennense*.
Moscas: *Stomoxys calcitrans*, *Lyperosia irritans*.

DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Mezclar 1 mL de producto en 1 litro de agua para baños de inmersión o aspersion.

Baños de Inmersión: 1 litro de producto por 1000 litros de agua, recargar con 1.5 litros de producto por 1000 litros de agua.

Baños de aspersion: 20 mL de producto por 20 litros de agua.

- No bañar más de 5 animales adultos por bomba de espalda por 20 litros.
- Para el control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* repetir el baño cada 21 días.
- Para el control de *Amblyomma cajennense* repetir el baño cada 7 días.

TIEMPO DE RETIRO

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 48 horas después de finalizado el tratamiento.

La leche producida durante el tratamiento y 48 horas después de finalizado el mismo, no debe darse para consumo humano.

ADVERTENCIAS:

En caso de Intoxicación mostrar la Etiqueta al médico.

No transportar ni almacenar con Alimentos de uso Humano o Animal.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

El fabricante garantiza que las características fisicoquímicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.



PRESENTACIONES:

Frasco x 20 mL

Frasco x 100 mL

Envase x 500 mL

Envase x 1000 mL

Registro ICA No. 6671 MV

AUROFARMA®

CampoLimpio™
PROGRAMA DE LAVADO DE ENVASES VACÍOS
COLOMBIA

Laboratorios Auromarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución de envases y empaques de plaguicidas, con Aprovechamiento y Campo Limpio

PASOS DE TRIPLE LAVADO PARA ENTREGA DE ENVASE VACÍO EN LUGAR DE ACOPIO:

1. Escurrir el envase vacío sobre el tanque de fumigación.
2. Agregar agua hasta un cuarto del envase de cipermetrina
3. Cerrar el envase y agitar fuertemente
4. Verter el contenido nuevamente en el tanque de fumigación hasta escurrirlo bien
5. Realizar los anteriores pasos 3 veces en total
6. Perforar el envase de Cipermetrina, dejarlo secar y llevar al centro de acopio de CAMPO LIMPIO más cercano.



Categoría Toxicológica II
ALTAMENTE TÓXICO



CUIDADO
VENENO

