

## FICHA TÉCNICA COCCIDIOL® Polvo soluble

**COMPOSICIÓN:**

Cada g de polvo oral contiene:

Amprolio	200 mg
Excipientes c.s.p	1 g

**ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:**

Aves, Bovinos y Porcinos.

**INDICACIONES:**

En aves para el control y tratamiento de coccidiosis ocasionadas por: *Eimeria tenella.*, *E necatrix.*, *E acervulina* y *E brunetti*. En Bovinos controla *E. bovis.*, *E. zuernii* y en Ovinos para *E. ovinodalis* y *E. ahsata*.

**VIA DE ADMINISTRACION:**

Oral, disuelto en el agua de bebida

**DOSIFICACIÓN:**

**Bovinos y Ovinos:** 10mg/kg de COCCIDIOL por kg de peso vivo. En la práctica disolver 1 g de COCCIDIOL por 20 kg de peso vivo.

**Aves:** 10mg/kg de COCCIDIOL por kg de peso vivo. En la práctica disolver 1 g de COCCIDIOL por Litro de agua por 7 días consecutivos (25g/25Litros de agua).

**TIEMPO DE RETIRO:**

**Las aves tratadas no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 24 horas después de finalizado el tratamiento.**



## PRECAUCIÓN:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consulte al médico veterinario.

Venta bajo fórmula del médico veterinario

Manténgase en lugar fresco y seco a una temperatura menor a 30°C

## PRESENTACIONES:

- Caja dispensadora de 40 sobres x 25 g
- Sobre por 1 kg

Reg. ICA: 2646-DB

AUROFARMA®

Plan Colectivo   
de Gestión de Devolución Posconsumo  
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurolfarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprove

