

FICHA TÉCNICA

ERIPANTO SECADO®

Suspensión intramamaria
(Uso Veterinario)

Antibiótico de amplio espectro

COMPOSICIÓN:

Cada mL de suspensión contiene:

Eritromicina estearato	100 mg
Excipientes c.s.p	1 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:

Bovinos

INDICACIONES: En vacas secas para el tratamiento de infecciones ocasionadas por: *Streptococcus sp.* y *Staphylococcus sp.*

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria

DOSIFICACIÓN:

Aplicar todo el contenido de la jeringa en cada cuarto al final del último ordeño del periodo de lactancia, en el momento de secado de la vaca cada 12 horas durante 3 días consecutivos.

TIEMPO DE RETIRO: La leche producida durante el tratamiento y 72 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano. Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 14 días después del tratamiento.

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos

Consérvese en sitio fresco y seco protegido de la luz a una temperatura inferior a 30°C

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.



PRESENTACIONES:

Caja de 4 jeringas x 12 mL

Colombia Reg. ICA: 3804 DB

AUROFARMA[®]

Plan Colectivo 
de Gestión de Devolución Posconsumo
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurolarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprove

