

FICHA TÉCNICA FLORMIX Solución Oral (Uso Veterinario)

ANTIBIÓTICO

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL de solución oral contienen:

Florfenicol.....20 g
Excipientes c.s.p..... 100 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Aves y cerdos

INDICACIONES

Antimicrobiano de amplio espectro indicado en Aves (Pollos de engorde, Pollonas, pavos) para el tratamiento de bacterias sensibles al florfenicol en enfermedades del tracto respiratorio, digestivo y urinario causados por: *E.coli.*, *Pasteurella sp.*, *Salmonella sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Bordetella sp.*, *Avibacterium paragallinarum.*, *Ornithobacterium rhinotracheale.*, *Mannheimia haemolytica* y *Trueperella pyogenes*. En Cerdos está indicado para el tratamiento de bacterias sensibles al florfenicol en enfermedades del tracto respiratorio y digestivo causados por: *Actinobacillus pleuropneumoniae.*, *Clostridium sp.*, *Pasteurella multocida.*, *Salmonella choleraesuis.*, *Bordetella bronchiseptica.*, *Corynebacterium sp.*, *Streptococcus suis.*, *Staphylococcus sp.*, *Actinobacillus suis* y *Haemophilus parasuis*.



DOSIS

Aves: Dosis general: 30 mg/kg de peso vivo. Se administra en el agua de bebida para lograr una concentración terapéutica de 150 ppm. En la práctica diluir 1 mL por cada Litro de agua cada 12 horas durante 5 días.

Cerdos: Dosis general: 20 mg/kg de peso vivo. Se administra en el agua de bebida para lograr una concentración terapéutica de 100 ppm. En la práctica diluir 0,5 mL por cada Litro de agua cada 12 horas durante 5 días.

PRECAUCIONES

Uso Veterinario.

El agua medicada debe ser consumida y preparada diariamente y ser la única fuente de bebida durante el tratamiento.

No combinar con otros antimicrobianos.

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.

Almacenar a una temperatura inferior a 30°C.

Mantener el envase bien cerrado.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

TIEMPO DE RETIRO

Las Aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano hasta 5 días después de finalizado el tratamiento.

No usar en Aves en producción de huevos para consumo humano.

Los Cerdos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 16 días de finalizado el tratamiento.



AUROFARMA®

BIENESTAR Y SALUD ANIMAL

PRESENTACIONES:

1L, 2L y 4L

REGISTRO ICA:

10453-MV

www.AUROFARMA.com

