

RATAQUILL®

BRODIFACOUMA 0,005%

BLOQUE PARAFINADO



Tarro plástico x 2,5 Kg
Tarro plástico x 10 Kg

RODENTICIDA CON BRODIFACOUMA



CONTROL DE
ROEDORES



BLOQUE / ALMENDRA
PARAFINADA



RESISTENTE A LA
HUMEDAD

Cebo rodenticida atrayente en forma de bloque parafinado (almendras) formulado a base de Brodifacouma al 0.005%, el cual provoca intoxicaciones a los roedores, hasta inducirlos a su muerte, producto de hemorragias internas al cabo de 2 a 3 días después de ingerido el cebo. Su fórmula grado alimenticio, satisface la dieta alimenticia de ratas y ratones por proteínas, cereales, y grasas garantizando una rápida ingestión por cualquier tipo de roedor.

- ✔ Listo para usar, no requiere mezclas ni aditivos.
- ✔ Palatabilidad superior para roedores del trópico.
- ✔ Ingrediente activo de última generación que garantiza intoxicación a ratas y ratones.
- ✔ Ideal para zonas externas con alta humedad.
- ✔ Tecnología BitterGuard®.

MINAGRO Industria Química

Formulador y Distribuidor de **Plaguicidas**
Ambientalmente Sostenibles de uso:
Agrícola, Pecuario, Doméstico y Salud Pública.



RATAQUILL®

BRODIFACOUMA 0,005%

RODENTICIDA

BLOQUE PARAFINADO



IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

Nombre comercial:	Rataquill® BB
Tipo de formulación:	Cebo rodenticida bloque parafinado para el control de ratas y ratones
Ingrediente activo:	Brodifacouma
Grupo Químico:	Derivado de las cumarinas
No. CAS:	56073-10-0

COMPOSICIÓN

Brodifacouma	0.005%
Benzoato de Denatonium	0.001%
Atrayentes e Inertes	99.994%

CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE



Caneca plástica
x10 Kg



Tarro plástico
x2.5 Kg

FICHA TÉCNICA

Para descargar la ficha técnica de este producto, escanee el código QR con su teléfono móvil ó acceda a nuestra página web, en la sección "Actualidad Informativa". Disponibles en descarga directa PDF.



ADVERTENCIA



Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado, en un lugar oscuro, seco y fresco; alejado de alimentos, personas y animales. No almacenar cerca de los alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Rataquill® Bloque parafinado (almendra) elimina ratas y ratones a los pocos días de ingerido el cebo. Su fórmula grado alimenticio (cereales, proteínas, azúcares, grasas) garantiza una rápida atracción e ingestión del producto por parte de ratas y ratones, de esta manera Rataquill® se mimetiza de manera perfecta dentro de la dieta alimenticia del roedor, sin causarle ningún tipo de alerta o recelo, tanto a los roedores jóvenes como los mas viejos de la colonia. Rataquill® incorpora la tecnología BitterGuard®, sustancia amarga para seres humanos y animales domésticos como perros y gatos, pero imperceptible para ratas y ratones. BitterGuard® reacciona en las papilas gustativas de los humanos y de las mascotas, con un sabor amargo, ácido el cual provoca la no ingestión del producto.

ÁMBITOS DE APLICACIÓN



Alta Humedad



Grandes extensiones



Áreas Externas



Redes de Alcantarillado



Cebaderos

MECANISMO DE ACCIÓN:

Una vez es ingerido Rataquill®, la brodifacouma se metaboliza dentro del organismo del roedor, ocasionándole fuertes hemorragias hasta provocarle su muerte.

MODO DE APLICACIÓN:

Antes de iniciar la aplicación de Rataquill®, realice una inspección del área infestada con el objetivo de:

- Estimar la cantidad total de roedores.
- Ubicar correctamente los puntos de aplicación del cebo (cebaderos).
- Aplicar la cantidad correcta de cebo raticida Rataquill®.
- Establecer la frecuencia y reemplazo de los cebos.
- Detectar madrigueras, lugares de tránsito, etc.

Se recomienda al inicio del tratamiento si es posible, reducir la disponibilidad de alimentos alternativos como desperdicios, basuras, y sobras cerca de los puntos de aplicación del cebo. Con la ayuda, de guantes aplique de 2 a 5 almendras en los puntos cebaderos seleccionados como estratégicos y de tránsito. Coloque el cebo dentro de tubos de PVC, cajas plásticas cebaderas, guaduas, etc cada 5 a 10 m para proveer un lugar seguro de alimentación a los roedores y evitar la ingestión accidental del cebo por parte de seres humanos o mascotas como perros y gatos. Marque los puntos de aplicación y notifique la aplicación a los residentes, administradores pecuarios, agricultores, etc sobre el tratamiento.

Realice inspecciones periódicas con el fin de monitorear el consumo del cebo y reemplazarlo por cebo fresco cada 5 a 7 días. Aplique nuevamente en los puntos donde haya observado consumo.

DOSIS DE APLICACIÓN:

La cantidad de cebo requerido depende del peso corporal del roedor, la cantidad total de roedores a controlar y la especie. Consulte el volante adjunto de "Rataquill® Uso Agrícola", "Rataquill® Uso Doméstico" y "Rataquill® Uso Pecuario" para conocer en detalle la dosificación según su uso.

MINAGRO Industria Química

Carrera 16 # 10 - 42, Bogotá D.C, Colombia
Email: minagro@minagroindustry.com
Tel: +57 1 3361021 / Movil: +57 311 237 93 22



www.minagroindustry.com

