

# VAPIREX®

BRODIFACOUMA 0,13%

## POMADA / UNGÜENTO



### VAMPIRICIDA CON BRODIFACOUMA



ESPECÍFICA PARA  
DESMODUS ROTUNDUS



ADHERENCIA  
ÓPTIMA



BAJA TOXICIDAD  
PARA ANIMALES DE  
GRANJA

Vapirex® es una pomada, desarrollada exclusivamente para el control de murciélago vampiro *Desmodus rotundus*, la cual incluye poderosos atrayentes para la especie. Su método de acción es por ingestión. Al cabo de 3 días la plaga muere debido al efecto anticoagulante de la Brodifacoum al 0.13%. Su textura, olor y sabor se mimetizan de manera perfecta alrededor de la herida ocasionada por el vampiro al animal. De esta manera, cuando el vampiro regresa a succionar la misma herida, se unta e ingiere la pomada. Posteriormente, mediante el hábito de acicalamiento, el vampiro tratado comparte la pomada a los demás individuos, disminuyendo así la población y las mordeduras.

- ☑ Ideal para aplicación directa o en captura de vampiros\*.
- ☑ Ingrediente activo de última generación que garantiza control poblacional del murciélago hematófago.
- ☑ Formulación resistente y duradera en condiciones climáticas adversas.
- ☑ Matriz específica para *Desmodus Rotundus*.

**MINAGRO** Industria Química

Formulador y Distribuidor de **Plaguicidas**  
**Ambientalmente Sostenibles** de uso:

Agrícola, Pecuario, Doméstico y Salud Pública.



# VAPIREX®

BRODIFACOUMA O, 1.3%

## POMADA



### IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO

<b>Nombre comercial:</b>	Vapirex® GS
<b>Tipo de formulación:</b>	Pomada oleosa vampiricida para el control del murciélago hematófago.
<b>Ingrediente activo:</b>	Brodifacouma
<b>Grupo Químico:</b>	Derivado de las cumarinas
<b>No. CAS:</b>	56073-10-0

### COMPOSICIÓN

Brodifacouma.....	0.13%
Atrayentes e Inertes.....	99.87%

### CONFIGURACIÓN DE EMBALAJE



Tarro plástico  
x 100 g



12 Tarros  
x Display  
dispensador

### FICHA TÉCNICA

Para descargar la ficha técnica de este producto, escanee el código QR con su teléfono móvil ó acceda a nuestra página web, en la sección "Actualidad Informativa". Disponibles en descarga directa PDF.



### ADVERTENCIA



Conserve el producto en el envase original etiquetado y cerrado, en un lugar oscuro, seco y fresco; alejado de alimentos, personas y animales. No almacenar cerca de los alimentos, bebidas o drogas de uso humano o animal.

### DOCUMENTOS DE DIVULGACIÓN TÉCNICA



Descargue la acción de comunicación titulada "Control poblacional del murciélago hematófago con Vapirex GS y prevención de contagio de rabio parálitica bovina"

## VAMPIRICIDA

### DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Vapirex® GS (pasta vampiricida) controla de manera efectiva la población del murciélago hematófago (*Desmodus Rotundus*) y por ende provoca una disminución de las mordeduras de la plaga en los animales afectados. Vapirex® se aplica al rededor de la herida en los animales ó en el dorso de los vampiros capturados con mallas de niebla. Una vez el producto es transportado hacia la colonia por el vampiro untado, Vapirex® actúa por ingestión, mediante el hábito de acicalamiento efectuado entre los diferentes individuos de la colonia. Vapirex® al ser aplicado al rededor de mordeduras o en el dorso de individuos de la especie, no afecta fauna silvestre benéfica. Su fórmula oleosa garantiza una adherencia óptima alrededor de la mordedura, sin provocar derrames o contaminación.

### ÁMBITOS DE APLICACIÓN



Bovinos



Equinos



Porcinos



Caprinos



Captura con mallas de niebla\*\*

### MECANISMO DE ACCIÓN:

Los vampiros untados con Vapirex® GS, ya sea por aplicación en captura ó alrededor de la herida, transportan la pomada hacia su nido, donde al practicar el hábito de limpieza y acicalamiento mutuo, ingieren la pomada, causando así, la intoxicación de toda la colonia. El efecto anticoagulante del ingrediente activo de Vapirex®, garantiza una reacción letal dentro del organismo del animal (Hemorragias internas y externas). No causa recelo ni rechazo a los vampiros.

### MODO DE APLICACIÓN:

Antes de aplicar la pomada vampiricida Vapirex® GS, tenga en cuenta:

1. Aisle los animales a ser tratados como medida de prevención.
2. No aplique la pomada en bovinos menores de 7 meses de nacido.
3. Aplique la pomada en horas de la tarde (4 a 6 p.m), preferiblemente en noches oscuras (fases lunares menguante y luna nueva).

Aplique suficiente cantidad de Vapirex® para cubrir el área alrededor de la herida, ó la parte del cuerpo del animal a proteger. Consulte el volante técnico de aplicación de Vapirex® disponible en la web.

### DOSIS DE APLICACIÓN:

La cantidad de pasta vampiricida requerida depende del número de mordeduras frescas, cantidad de animales atacados y tamaño de los mismos. Lea con atención la etiqueta del producto. Consulte el instructivo de aplicación, disponible en la web.

**MINAGRO** Industria Química

Carrera 16 # 10 - 42, Bogotá D.C, Colombia  
Email: minagro@minagroindustry.com  
Tel: +57 1 3361021 / Movil: +57 311 237 93 22

