

FICHA TÉCNICA
Q-B COMPLEX®
Solución inyectable**COMPOSICIÓN:**

Cada mL solución inyectable contienen:

COMPOSICIÓN	CANTIDAD
Cloruro de sodio(*)	1.25 mg
Cloruro de calcio (*)	0.2 mg
Cloruro de potasio (*)	0.2 mg
Sulfato de magnesio (*)	0.1 mg
Pantotenato de calcio (*)	0.1 mg
Dextrosa (*)	60 mg
Tiamina HCl	0.06 mg
Riboflavina 5 fosfato sódico	0.1 mg
Piridoxina HCl	0.1 mg
Cianocobalamina	0.5 mcg
Nicotinamida	1 mcg
Glutamato monosódico	0.05 mg
L-metionina	0.1 mg
L-triptofano	0.05 mg
L-treonina	0.05 mg
L-isoleucina	0.1 mg
L-fenilalanina	0.15 mg
L-valina	0.125 mg
L-lisina	0.2 mg
L-leucina	0.24 mg
L-histidina	0.5 mg
Excipientes csp	1 mL



(*) Mínimos garantizado:

Sodio: 0.49 mg

Potasio: 0.09 mg

Calcio: 0.08 mg

Magnesio: 0.04 mg

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:

Bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y gatos.

INDICACIONES:

En Bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caninos, gatos asociación de vitaminas, minerales y aminoácidos como coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias de los elementos presentes en la composición. Otras indicaciones a criterio del Médico Veterinario.

VIA DE ADMINISTRACION, DOSIFICACION Y ESPECIES:

Bovinos y Equinos: 2-3 mL/Kg durante 3 días via IV lenta o Subcutánea

Porcinos y Ovinos: 2-3 mL/Kg durante 3 días via IV lenta o Intraperitoneal

Perros y gatos: 10 mL/Kg durante 3 días vía IV o Subcutánea

TIEMPO DE RETIRO:

No requiere tiempo de retiro.

PRECAUCIONES:

Temperaturas extremas, humedad y luz solar directa puede provocar daños al producto.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO EN ANIMALES:

Cuando se aplique por vía endovenosa tener en cuenta las siguientes precauciones:
Aplicar lentamente.

En las infusiones intravenosas los riesgos de trombosis deben ser considerados.



Pueden presentarse reacciones anafilácticas después de inyecciones intravenosas en raras ocasiones.

Se recomienda calentar a 37 C° o temperatura del cuerpo previamente a la aplicación de grandes volúmenes.

Si la infusión es prolongada debe seleccionarse otra vena para la aplicación después de 12 – 24 horas.

El producto debe usarse con cuidado en animales con daños cardiacos o renales puede producir una sobrecarga de sodio.

No combinar con otras preparaciones o sustancia.

PRESENTACIONES:

- Frasco x 500 mL

Reg. ICA: 8164-MV

AUROFARMA®

Plan Colectivo 
de Gestión de Devolución Posconsumo
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurofarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprove

