

**FICHA TÉCNICA**  
**Q-IVERMEC 3.5®**  
**Solución Inyectable**

**COMPOSICIÓN:**

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:

Ivermectina	35 g
Excipientes c.s.p	100 mL

**ESPECIES DESTINO:** Bovinos.

**INDICACIONES:** Para tratamiento y control de los parásitos internos y externos de bovinos.

**Endoparásitos:**

**Parásitos Gastrointestinales:** *Ostertagia ostertagi*, *Ostertagia lyrata*, *Haemonchus placei*, *Mecistocirrus digitatus*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Cooperia onchophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Bunostomum phlebotomum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Toxocara vitulorum*.

**Parásito Pulmonar:** *Dictyocaulus viviparus*.

**Otros Nematodos:** *Parafilaria bovicola*, *Thelazia sp.*

**Ectoparásitos**

**Nuches:** Ayuda en el control de *Dermatobia hominis* e *Hypoderma sp.*

**Piojos chupadores:** *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus*, *Solenoptes capillatus*.

**Piojos Masticadores:** Ayudan en el control de *Damalina bovis*.

**Ácaros de la sarna:** *Psoroptes communis var bovis*, *Sarcoptes scabiei var bovis*, ayuda en el control de *Chorioptes bovis*.

**Miasis:** *Cochiliomyia hominivorax*.

**Garrapatas:** Ayuda en el control de *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*.



**VIA DE ADMINISTRACIÓN, DOSIFICACIONES Y ESPECIES:** Inyección subcutánea en Bovinos a una dosis de 200 ug de Ivermectina por kg de peso vivo. Cada mL contiene 10 mg de ivermectina, suficiente para tratar 50 kg de peso corporal.

Peso corporal (kg)	Volumen de Dosis (mL)
Hasta 50	1
100	2
150	3
200	4
250	5
300	6
350	7
400	8
450	9
500	10
550	11
600	12

**PRECAUCIONES:**

- No usar en vacas de periodo de lactación.
- Evite el contacto directo con la piel y ojos.
- Evite fumar o comer después de manipular del producto.
- Venta bajo fórmula de Médico Veterinario.
- Manténgase en lugar fresco y seco.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**TIEMPO DE RETIRO:**

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 122 días después de finalizado el tratamiento.
- No administrar a vacas en producción de leche destinadas al consumo humano, ni 122 días antes del parto.



## PRESENTACIONES:

Frasco x 50ml

Frasco x 250ml

Frasco x 500ml

COLOMBIA Reg. ICA 8008 MV

AUROFARMA®

Plan Colectivo   
de Gestión de Devolución Posconsumo  
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Aurofarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprovet

