

FICHA TÉCNICA **TOTALMAST®** Suspensión intramamaria

COMPOSICIÓN:

Cada jeringa por 10g de suspensión contienen:

Cefoperazona sódica	250 mg
Excipientes c.s.p.	10g



ESPECIES PARA LAS CUALES ESTA INDICADO:

Bovinos

INDICACIONES:

Esta indicado al ganado vacuno en lactación para el tratamiento de mastitis clínicas agudas y subagudas causadas por: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Micrococcus sp*, *Escherichia coli*, *Streptococcus uberis*, *Trueperella pyogenes*, *Pseudomona aeruginosa*, *Streptococcus agalactiae*, *Actinomyces bovis*, *Klebsiella sp*.

ADMINISTRACIÓN:

Intramamaria previa antisepsia externa de la ubre



DOSIFICACIÓN:

Previa antiseptia externa de la ubre y vaciado a fondo, colocar el contenido de la jeringa dentro de cada cuarto, masajear suavemente para que el medicamento alcance las regiones mas profundas. TOTALMAST es administrado en dosis única

TIEMPO DE RETIRO:

Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 4 días después de finalizado el tratamiento. La leche producida durante el tratamiento y 96 horas después de finalizado el mismo no debe darse al consumo humano ni a la industrialización.

EFECTOS SECUNDARIOS

Las cefalosporinas incluyendo el TOTALMAST al igual que cualquier antibiótico beta-lactámico pueden presentar esporádicamente reacciones alérgicas

SOBREDOSIFICACIÓN

Al tratarse de un medicamento de aplicación tópica intramamaria, no se produce intoxicación por sobredosificación ya que los tejidos mamarios tienen carácter secretor y la absorción sistémica es mínima.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRESENTACIONES: Inyectores individuales de 10g

REG.ICA: 9396 MV

