



CATÁLOGO DE PRODUCTOS  
**GALLINAS PONEDORAS**



**AUROFARMA**

ANTIPARASITARIOS

**AVICUR POLVO** | Fenbendazol 4%

**Indicaciones:** Antiparasitario en polvo de amplio espectro indicado en el tratamiento de nemátodos gastrointestinales y pulmonares.

**Dosis:**  
20- 50mg/kg. En la práctica suministrar vía oral en el agua de bebida: 2.5g por Litro de agua durante 5 días. Para el agua usar presentación de sobre por 20g y 1kg.  
En el alimento: Mezclar 1,5kg por tonelada de alimento durante 7 días. Para el alimento usar presentación de 12,5kg

**Tiempo de retiro:** 3 días

**Presentaciones:** Caja de 50 sobres por 20 g, sobre por 1 kg y Bolsa por 12,5 kg.

**Reg ICA 4638 DB**



ANTICOCCIDIALES

**COCCIDIOL** | Amprolio 20%

**Indicaciones:** Anticoccidial en polvo indicado en el control y tratamiento de la coccidiosis ocasionada por *Eimeria spp.*

**Dosis:** 10 mg/kg. En la práctica suministrar vía oral 1 g disuelto en 1 litro de agua durante 7 días.

**Tiempo de retiro:** 1 día

**Presentaciones:** Caja de 40 sobres por 25 g, Sobre por 1 kg.

**Reg ICA 2646 DB**



VITAMINAS

**AUROFARVIT ORAL**

| Complejo B, ácidos orgánicos, Biotina y Glicerofosfatos

**Indicaciones:** Vitaminas del complejo B en suspensión indicado como estimulante del apetito, antianémico, hidratante, neurotónico y eliminador de estrés.

**Dosis:** Administrar vía oral directamente o diluido en el agua de bebida: 3 mL por cada litro de agua

**Presentaciones:** Frasco por 120 mL, Garrafa por 1000 mL y 4000 mL

**Reg ICA 4919 DB**



## AUROVITEL | Multivitámico con electrolitos

**Indicaciones:** Multivitámico en polvo soluble con electrolitos indicado en el tratamiento de las condiciones de estrés por enfermedad, vacunación, despique, transporte, variaciones climáticas, estados de deshidratación y convalecencia.

**Dosis:** Administrar vía oral diluido en el agua de bebida: 1 g disuelto en 10 litros de agua de bebida, durante 3 días.

**Precauciones:** Preparar soluciones diariamente en agua potable. No administrar en combinación con otros medicamentos.

**Presentaciones:** Caja de 45 sobres por 20g, Sobre por 100g, sobre por 1 kg.

Reg ICA 4551 DB



### SUPLEMENTOS / NUTRACÉUTICOS

## AUROLITOS | Potasio, Sodio, Magnesio, Vitamina C

**Indicaciones:** Suplemento alimenticio en polvo a base de potasio, sodio, magnesio y vitamina C para suministrar en todas las etapas productivas.

**Modo de uso:** Suministrar vía oral 1 g /1-2 Litros de agua durante 5 a 7 días.

**Presentaciones:** Sobre por 1 kg

Reg ICA 16582 SL



## HEPAXYN | Silimarina 10% | Cynara 25% | Lecitina soya 20% | L-metionina 5%

**Indicaciones:** Suplemento alimenticio en polvo a base de *Silybum marianum*, *Cynara scolymus* para ser suministrado como protector hepático previniendo y controlando patologías hepáticas, síndrome de hígado graso y afecciones hepáticas generadas por alimentos, agentes tóxicos o medicamentos.

**Modo de uso:** Suministrar vía oral diariamente mezclado con el alimento:  
250g-350g/Tonelada de alimento

**Presentaciones:** Saco por 25 kg

Reg ICA 16055 SL



## AUROFARMA YUCASHID POLVO | Yucca Schidigera 99,5 g

**Indicaciones:** Suplemento alimenticio oral a base de extracto de *Yucca Schidigera* para ser suministrado en todas las etapas productivas disminuyendo la concentración de amoníaco en heces y orina, la humedad en las camas y la aparición de enfermedades gastrointestinales.

**Modo de uso:**

Suministrar vía oral, diariamente mezclado con el alimento 115 g/Tonelada

**Recomendaciones:** El tiempo de suministro debe ser continuo y como mínimo un mes en el alimento.

**Presentación:** Saco por 25 Kg

**Reg ICA 16387 SL**



PREMIX

## AUROFARMA AUROQUINOL 60 | Halquinol 60%

**Indicaciones:** Aditivo no antibiótico en polvo para premezcla indicado como mejorador del desempeño, para usar en alimentos completos mejorando la eficiencia alimenticia y promoviendo el incremento de peso en todas las etapas productivas.

**Modo de uso:** Incorporar en el alimento concentrado: 50g/Tonelada de alimento (30ppm).

**Precauciones:** No utilizar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.

**Presentaciones:** Saco por 25 kg

**Reg ICA 16115 SL**



DESINFECTANTES

## AUROFARMA CREO-TAY | Fenol 16,5%

**Indicaciones:** Emulsión antiséptica y desinfectante a base de aceites creosotados de uso externo. Para la desinfección de instalaciones pecuarias aún en presencia de materia orgánica.

**Dosis:**

Antisépsia en animales: Diluir 30 mL en agua para obtener 1 litro de solución final de una concentración del 3%  
Desinfección superficies inanimadas: Diluir 120 mL agua para obtener 1 litro de solución final requerida, de una concentración del 12%

**Presentaciones:** Frascos por 120 mL, 250 mL, 500 mL. Garrafas por 1000 mL, 3800 mL y 18750 mL.

**Reg ICA 2262 DB**



## VANOVET | Yodo 2,6%

**Indicaciones:** Solución desinfectante con efecto bactericida, fungicida y viricida, utilizado como antiséptico de uso externo, en instalaciones y para potabilizar el agua.

**Dosis:**

**Bebedores, comederos, depósitos de agua, desinfección de baldes y canecas:** 2 mL por litro de agua

**Vehículos de transporte de animales:** 3 mL por litro de agua.

**Implementos de granja, manos, botas, tapetes sanitarios:** 4 mL por litro de agua.

**Potabilizar el agua de bebida:** 0.5 mL por litro de agua

**Presentaciones:** Frasco por 120 mL, 360 mL. Garrafa por 1000 mL, 3750 mL y 18750 mL.

Reg ICA 2497 DB



## GLH 20 | Glutaraldehído 20%

**Indicaciones:** Solución desinfectante para usar sobre superficies inanimadas como paredes, pisos, techos de galpones, gallineros e instalaciones pecuarias en general.

**Usos:** Se aplica a una dilución de 1:200 (0,1%): Aplicar a una dosis de 5 mL/1Litro de agua. En la práctica diluir 1 litro por cada 200 L de agua.

**Recomendaciones:** Aplicar el producto directamente de manera uniforme por aspersión y permitir que actúe durante 15-20 minutos, no enjuagar. Para una desinfección adecuada es necesario que se limpie la superficie previa al uso del producto, se recomienda usar agua a presión para retirar la mayor cantidad posible de material orgánico.

**Precauciones:** El producto es incompatible con amoníaco y productos que contengan ácidos y bases fuertes

**Presentaciones:** Frasco por 500 mL, 1L y Garrafa por 3800 mL y 20 L

Reg ICA 10423 MV



### DISTRIBUCIÓN

## CHICKTONIC | Vitaminas y minerales

**Indicaciones:** Solución oral multivitáminica adicionada con 20 aminoácidos diseñada para corregir y prevenir estados carenciales, mejorar el estado inmunitario y estimular la recuperación de tejidos

**Dosis:** 1 mL por cada Litro de agua de bebida

**Presentación:** Frasco por 1 L

Reg ICA 10954 SL



**BETAMINT** | Betaina, Vitamina C, Electrolitos, mentol

**Indicaciones:** Solución oral mentolada con efecto refrescante y estimulante del metabolismo que disminuye los efectos negativos del estrés en aves y reduce la aparición de hígado graso.

**Dosis:** 1 mL/1L de agua de bebida durante 3 a 5 días

**Presentación:** Frasco por 1 L

**Reg ICA 8088 MV**



**DI-HEPTARINE** | Silimarina fosfatido 16%

**Indicaciones:** Solución oral indicada para la terapia y prevención de alteraciones hepáticas metabólicas (sobrealimentación o ingesta de alto valor energético), provocadas por contaminación del alimento con toxinas de origen vegetal o fúngico, producidas por agentes virales o bacterianos o como resultado de tratamientos antiinfecciosos.

**Dosis:** En el agua de bebida como Terapéutico: 25 mL - 50 mL cada 100 litros de agua de bebida.  
En el alimento como Terapéutico: 500 - 1000 mL de Producto / Ton de Alimento

**Presentación:** Frasco por 1 L

**Reg ICA 6650-SL**



**FLORAMAX B11** | Probióticos

**Indicaciones:** Fuente de bacterias intestinales productoras de ácido láctico, para ser usadas en aves de corral. Establece una competencia con la flora patógena generando efectos benéficos para el hospedador mejorando las propiedades de la flora nativa del animal. Indicado ante cambios de alimento, luego de terapias antibióticas, o según criterio del profesional veterinario

**Dosis:** El envase de 60 g es suficiente para tratar 10.000 aves.

**Presentación:** 60 g

**Reg ICA 9963- SL**



## PERFORMIZER | Ácidos orgánicos | Solución oral

**Indicaciones:** Aditivo acidificante en solución para mejorar la eficiencia alimenticia en ponedoras y pollos de engorde.

**Dosis:** Suministrar vía oral disuelto en el agua de bebida: 1 litro por cada 1000 litros de agua de bebida.

**Presentación:** Frasco por 5 L

**Reg ICA 11254 SL**



## UNIWALL MOS 25 | Ácidos grasos de cadena media, Vitaminas A, D3 y E

**Indicaciones:** Suplemento nutricional en polvo a base de ácidos orgánicos y pared de levaduras indicado como destructor de bacterias Gram negativas presentes en el alimento de aves y como suplemento nutricional de proteínas y carbohidratos favoreciendo el equilibrio de la microbiota intestinal.

**Dosis:**  
En alimento pre-iniciador e iniciador: 2 kg./ton.  
En alimento de terminador y de retiro: 1 kg./ton.

**Presentación:** Saco por 25 kg

**Reg ICA 14702 SL**



## ENRAMICINA | Enramicina 8%

**Indicaciones:** Aditivo en polvo indicado en Aves (ponedoras) como mejorador del desempeño, incrementando la eficiencia alimenticia en todas las etapas productivas.

**Dosis:**  
Aves: Suministrar 12,5g - 63g por tonelada de alimento.

**Presentaciones:** Saco por 25 kg

**Reg ICA 14141 SL**





**Laboratorio Auofarma S.A.S.**

Km. 13 Vía Occidente, Funza - Bodegas Itacol

Funza, Cundinamarca - Colombia

Línea de Atención al Cliente: 320 349 7579

**PBX:** (571) 422 1390 - 422 1391

**AUROFARMA**


Plan Colectivo   
de Gestión de Devolución Posconsumo  
de Medicamentos Veterinarios Vencidos



Laboratorios Auofarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución Posconsumo de Medicamentos vencidos, y sus envases con o sin residuos de Medicamentos de uso veterinario, con Aprovet.

**AUROFARMA**<sup>®</sup>

SOMOS UNA EMPRESA VINCULADA



[www.AUROFARMA.com](http://www.AUROFARMA.com)