

Florfenicol 20%

Antibiótico en Solución Oral

Reg ICA 10453 MV

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada 100 mL de solución inyectable contiene:
Florfenicol..... 20 g
Excipientes c.s.p..... 100 mL

Indicaciones

En **Aves (Pollos de engorde, Pollonas, pavos)** para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio, digestivo y urinario causados por: *E.coli*, *Pasteurella sp.*, *Salmonella sp.*, *Staphylococcus sp.*, *Streptococcus sp.*, *Bordetella sp.*, *Avibacterium paragallinarum*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Mannheimia haemolytica* y *Trueperella pyogenes*.

En **Cerdos** está indicado para el tratamiento de enfermedades del tracto respiratorio y digestivo causados por: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Clostridium sp.*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella choleraesuis*, *Bordetella bronchiseptica*, *Corynebacterium sp.*, *Streptococcus suis*, *Staphylococcus sp.*, *Actinobacillus suis* y *Haemophilus parasuis*.

Especies destino



Vía de administración y dosis

Vía oral diluido en el agua de bebida.

AVES: Diluir 1 mL por cada litro de agua, equivalente a 30 mg/Kg en una concentración terapéutica de 150 ppm cada 12 horas durante 5 días.

CERDOS: Diluir 0,5 mL por cada litro de agua, equivalente a 20 mg/Kg en una concentración terapéutica de 100 ppm cada 12 horas durante 5 días

Tiempo de retiro

- Las Aves tratadas no deben sacrificarse para consumo humano hasta **5 días después** de finalizado el tratamiento.
- No usar en Aves en producción de huevos para consumo humano.
- Los Cerdos tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta **16 días después** de finalizado el tratamiento.

Contraindicaciones

- No utilizar en animales con hipersensibilidad a los componentes.

Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco protegido de la luz y a una temperatura inferior a 30° C.
- El agua medicada debe ser consumida y preparada diariamente y ser la única fuente de bebida durante el tratamiento.
- No combinar con otros antimicrobianos.
- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario

Presentaciones



10 mL, 50 mL y 100mL

Más información

