

FICHA TÉCNICA **LHIFLUNEX®** Solución inyectable (Uso Veterinario)

ANTIINFLAMATORIO NO ESTEROIDAL (AINE)

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

Cada mL de solución contiene:

Flunixin (Meglumine).....50 mg
Excipientes c.s.p..... 1 mL

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO

Bovinos, Equinos, Porcinos y caninos

INDICACIONES Y DOSIS:

BOVINOS:

Vía intravenosa lenta o intramuscular

Inflamaciones asociadas a enfermedades del tracto respiratorio: 0,44 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v.

En el tratamiento de síntomas producidos por endotoxinas de *E. coli*: 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v.

Repetir si es necesario a intervalos de 24 horas, pero no más de 5 días consecutivos



EQUINOS:

Vía intravenosa lenta o intramuscular

Dolores viscerales asociados a cólicos: 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. IV lenta al iniciarse los síntomas. Puede ser repetido 1-2 veces si reaparecen los síntomas.

En inflamaciones y dolores asociados con alteraciones músculoesqueléticas y en la modulación de los signos clínicos patológicos de la endotoxemia: 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. IM o IV. Puede repetirse durante cinco días.

PORCINOS

Vía intramuscular profunda e intravenosa lenta

Tratamiento de inflamaciones agudas asociadas con artritis, mamitis y en el síndrome de mastitis metritis agalactia (M.M.A.): Administrar 2 ml de Lhiflunex/45 Kg de p.v. por vía intramuscular profunda. Puede administrarse 1 - 2 inyecciones cada 12 horas. El número de dosis a administrar depende de la respuesta clínica obtenida.

En cerdos: administrar 0,44 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía intravenosa o intramuscular. Repetir a intervalos de 24 horas, si es necesario, pero no más de 5 días.

CANINOS:

Vía intravenosa lenta o subcutánea

Terapia complementaria en el tratamiento del shock endotóxico o séptico y en el alivio del dolor en trastornos osteomusculares: administrar 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía intravenosa lenta, cada 12 horas, hasta un máximo de 3 dosis. Es esencial incluir tratamiento antimicrobiano y fluidoterapia.

Trastornos osteomusculares: administrar 0,22 ml de Lhiflunex/10 Kg de p.v. por vía subcutánea, una vez al día, durante 3 días.



TIEMPO DE RETIRO

Los Bovinos y Porcinos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano durante el tratamiento y hasta 7 días después de finalizado el mismo.

Leche: 48 horas

PRECAUCIONES:

Manténgase fuera del alcance de los Niños y Animales domésticos.

Consérvese a una temperatura inferior a 30°C.

Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10, 50 y 100mL

Reg. ICA: 9346 MV



LIVISTO

Along with you

