

FICHA TÉCNICA **PULPHOX®** Polvo externo

Insecticida de uso externo

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contiene:

Cipermetrina	1 g
Excipientes c.s.p	100 g

ESPECIES PARA LAS CUALES ES RECOMENDADO:

Perros.

INDICACIONES:

Antiparasitario de uso externo para el control de **Pulgas**: *Pulex irritans*, *Ctenocephalides canis*. **Piojos**: *Trichodectes canis*, *Linognathus setosus*, *Felicola subrostratus*. **Garrapatas**: *Rhipicephalus sanguineus*.

FORMA DE APLICACIÓN:

PULPHOX® se adhiere sobre la piel, obteniéndose un buen efecto residual. Aplique **PULPHOX®**, déjelo actuar por 5 minutos y proceda a cepillar su animal. En lugares con alta incidencia de ectoparásitos debe espolvorearse **PULPHOX®** sobre la cama de la mascota.

CONDICIONES DE MANEJO:

PULPHOX® debe ser aplicado con elementos de seguridad. Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa de calle.

PULPHOX® es muy tóxico para los peces y en general, para la vida acuática.



No contamine las fuentes de agua con los desechos de la aplicación o con envases vacíos.

PULPHOX® es tóxico si se ingiere.

No comer, beber, ni fumar durante el manejo y aplicación del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: No debe transportarse, ni almacenarse con alimentos, bebidas, ni medicamentos para uso humano y animal.

En instalaciones ganaderas evítese contaminar los alimentos de consumo directo.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: Lavar con agua inutilice el envase triturándolo o perforándolo después de usar el producto y almacénelo de manera segura en los puntos de acopio de cada zona.

PRIMEROS AUXILIOS: Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos.

Contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón, las ropas contaminadas deben ser lavadas muy bien antes de volver a usarlas.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO: No hay antídoto específico. Tratar sintomáticamente según criterio médico y bajo estricta supervisión del mismo. Si hay convulsiones administrar DIAZEPAN 10 mg para adultos, tratar asma o anafilaxia con Adrenalina 0,1 a 0,5 mL I.M, tratar rinitis con antihistamínicos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO Y LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE O LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y MUESTRELE UNA COPIA DE LA ETIQUETA.

PRECAUCIONES:

Se debe evitar su ingestión.

No aplicar directamente sobre los ojos y la nariz de los animales.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Categoría farmacológica II – Altamente tóxico.

Consulte al Médico veterinario.



PRESENTACIONES:

- Talquera x 100 g.

Reg. ICA: 6199 MV

AUROFARMA®


PROGRAMA DE MANEJO DE ENVASES VACIOS
Columbia

Laboratorios Aurofarma S.A.S está comprometido con el programa colectivo de Gestión de devolución de envases y empaques de plaguicidas, con Aprovet y Campo Limpio

MANEJO DEL ENVASE VACIO EN EL LUGAR DE ACOPIO

1. Cuando el producto sea completamente agotado, debe ser perforado para su inutilización.
2. Llevarlo al centro de acopio de CAMPO LIMPIO más cercano.

