

FICHA TÉCNICA
Q-TILMICOX®
Polvo Oral
Uso Veterinario

COMPOSICIÓN:

Cada g de polvo oral contiene:

Tilmicosina fosfato	100 mg
Excipientes c.s.p.	1 g

ESPECIES PARA LAS CUALES ESTA INDICADO:

Cerdos

INDICACIONES:

Q-TILMICOX está indicado para el control y tratamiento de las infecciones en cerdos causadas por *Actibacillus pleuropneumoniae*; *Pasteurella multocida*; *Trueperella pyogenes*, *Mycoplasma hyopneumoniae*.

ADMINISTRACIÓN:

Vía oral, mezclado en el alimento.

DOSIFICACIÓN:

8-16 mg/Kg de peso. En la practica 2-4 Kg por tonelada de alimento; equivalentes a 200 – 400 ppm. Suministrar durante 15 días continuos.

TIEMPO DE RETIRO:

Los cerdos tratados no deben sacrificarse para el consumo humano hasta 14 días después de finalizado el tratamiento.

PRECAUCIÓN:

No utilizar en cerdos reproductores, ni permitir que los caballos tengan acceso al reducto o alimento que lo contiene. Utilizar la indumentaria adecuada (guantes, tapabocas, ropa, gafas y gorro) para hacer la mezcla.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantenga en lugar fresco y seco.

PRESENTACION:

- Bolsa x 25 Kg

COLOMBIA Reg. ICA 8131 MV

