

## Rafoxanide 3%

### Antiparasitario y Fasciolicida en Suspensión oral

Reg ICA 3678 MV

### Uso Veterinario

## Composición Garantizada

Cada mL de suspensión oral contiene:

Rafoxanide..... 30 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

## Indicaciones

Indicado para el control y tratamiento de:

**Bovinos:** *Fasciola hepática* y *Haemonchus contortus*

**Ovinos:** *Oestrus ovis*,

## Especies destino



## Vía de administración y dosis

Administrar vía oral directamente

En la práctica administrar 1 mL por cada 4 Kg de peso, equivalente a 7,5 mg/Kg de Rafoxanide

## Tiempo de retiro

- Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano **hasta 28 días después** de finalizado el tratamiento.
- No utilizar en hembras en producción de leche destinada al consumo humano.

## Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a los componentes.

## Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30° C.
- Venta bajo fórmula del médico veterinario.
- Frecuencia y dosis pueden variar a criterio del médico veterinario

## Presentaciones



30 mL, 120 mL, 1000mL

## Más información

