

Coccidiocida

Antiparasitario en Polvo Oral

Reg ICA 3106 DB

Uso Veterinario

Composición Garantizada

Cada g de polvo oral contiene:

Amprolio..... 166,7 mg

Sulfaquinoxalina sódica.... 166,7 mg

Excipientes c.s.p..... 1 mL

Indicaciones

Indicado en el control de coccidiosis ocasionada por:

Pollos de engorde, pollonas de reemplazo y reproductoras: *Eimeria tenella*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria acervulina* y *Eimeria brunetti*. *E. máxima*, *E. mivati*.

Pavos: *Eimeria meleagridis* y *Eimeria adenoides*.

Terneros y corderos: *Eimeria bovis*, *Eimeria zuernii*,

Especies destino



Vía de administración y dosis

Administrar vía oral disuelto en el agua de bebida.

TERNEROS: Administrar 1,5 g por cada 25 Kg de peso vivo cada 24 horas por 5 días, equivalente a 10 mg/kg de Amprolio y 13 mg/kg de Sulfaquinoxalina

CORDEROS: Administrar 1 g por cada 10 Kg de peso vivo cada 24 horas por 5 días, equivalente a 50 mg/Kg Amprolio y 15 mg/Kg Sulfaquinoxalina

AVES Y PAVOS: Mezclar 6 g en 10 litros de agua de bebida cada 24 horas por 7 días, equivalente a 20 mg/Kg Amprolio y 30 mg/Kg Sulfaquinoxalina

Tiempo de retiro

- Los animales tratados no deben sacrificarse para el consumo humano **hasta 10 días después** de finalizado el tratamiento.
- No administrar en vacas cuya leche sea destinada al consumo humano
- No administrar a aves en producción de huevos para el consumo humano ni durante las cuatro semanas anteriores al inicio de la postura

Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a los componentes.

Precauciones / Advertencias

- Manténgase fuera del alcance de niños y animales domésticos
- Consérvese en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30° C.
- Venta bajo fórmula del médico veterinario.

Presentaciones



25 g, 1000 g

Más información

